

「PCIに関する今日の問題」
大森赤十字病院循環器内科 部長
持田 泰行 先生

参加 68名

秋嶋薬局 秋嶋、秋嶋、小長井
アサヒ調剤薬局 桑原 中畔、白井、木島、内田
アサヒ薬局 天野
アサヒ薬局医大前店 中畔、島田、豊田、八巻
うのき薬局 大江
うめやしき薬局 平岩
エース薬局 脇別符、
江島薬局 中野 江島、浅野
大森薬局 平岡、伊藤、富岡、金谷、武田
大森日赤病院薬剤部 平岩、石久、飯竹、市川 大橋 三村
大森会営薬局 野村、岡川、小篠、久保田、和田、石原
杏仁堂薬局 堀井
京浜堂薬局 保科
コーコク薬局 松原、田辺、重信
サガワ薬局 佐川、篠原
サガワ薬局徳持店 嶋田、宇津木、
佐藤薬局 戸田
すみれ調剤薬局 平賀
中川薬局糞谷店 平澤、
にしかわ薬局 新木、福井、根津
日本メディケア大森薬局 西村
博薬堂薬局 柳、直井、八代
ハナブサ薬局 秋元、宮崎
ひまわり調剤薬局 曾我、
平井薬局 藤巻
ひろみ薬局中央店 橋本
ひろみ薬局池上店 宮田
美原薬局平和島店 田中、赤間
美原薬局梅田店 藤本
ユタカ薬局 小川
ゆりかご薬局 清水
吉田薬局仲六郷店 古畑・吉田、

質疑応答

Q:ステントを入れる際のワイヤーの曲げ方は、先生のご経験によって決められているのでしょうか？

A:やはり経験によって決めております。

Q:再狭窄を予防する目的で抗血小板薬を処方されていると伺いましたが、一年たったら減らすようなルールはありますか？実際にそのようなケースがありましたので。

A:ガイドラインでは2剤(バイアスピリン100mg、プラビックス75mg)から、半年後にはどちらか1剤にすることを推奨しています。

一般的には、多くの施設が一年後に再検査してステントの状態を確認してから、減らしています。また、その際再狭窄している場合には、2剤にプレタールを追加するなど、PT—INT をみて薬剤を増やすこともあります。

Q:ステントを入れられない人が、バイパス手術を行うという理解で大丈夫でしょうか？

A:講演の要約になりますが、3か所とか4か所ステントを入れなくてはならないような、複雑な症例では、バイパス術がよいと考えられます。

次回は1月15日です。