大田区薬剤師会実践勉強会　実践レポート

大田区薬剤師会　中畔勇一
味の素製薬株式会社　共催

2014 年 12 月 9 日（火）
『胃癌患者における栄養管理の最近の話題』
東邦大学医療センター大森病院　一般・消化器外科　教授
島田　英昭先生

参加者 65 名【演者含む】

アサヒ薬局	天野、中畔、木島、桑原
アサヒ薬局医大前店	中畔、豊田、八巻
秋島薬局	田多井
いけがみ薬局	佐野
市川薬局	小野
江島薬局	浅野、江島
大森会営薬局	石原、関川
大森赤十字病院	市川、大橋、高田
げんき薬局	粂川
コーコク薬局	田辺、松原、五十嵐
さがわ薬局	宇津木、佐川
山王薬局 1 丁目店	安藤
スギ薬局大田うの木	遠山、高、勝又
スマイル薬局	藤井、渡辺、山崎、久保田、古屋
すみれ調剤薬局	平賀
長栄堂薬局	嶋田、森下、塚越、秋山
東京労災病院	嶋田
東邦大学大森病院	小河原、鈴木、疋田、西尾、菅井、柳野、濱田、小川、有田、和久、竹内、島田【演者】
ナガエ薬局	小林、中村
にしかわ薬局	新木、福井
ハナブサ薬局	秋元、宮崎
ひまわり調剤薬局	曽我
平井薬局	栗原
ひろみ薬局	平林、増田

プラザ薬局	長内
美原薬局	赤間、古川、田中
個人会員	引地

質疑応答

Q.「S-1 を途中でやめてしまう理由は主になにがあるのでしょうか」

A.「体重減少もありますが、一番大きな理由は副作用により患者さん本人の意思で止めてしまうケースが多いです。レスキューとしてアロキシは急性期、遅延性の悪心にも効果があるようです。」

Q.「胃切除をした患者さんに PPI が処方されているケースがありますが、胃が切除されても PPI は効果はあるのでしょうか」

A.「全摘か幽門側切除によって違いますが、全摘の場合は逆流性食道炎のために投与している可能性はあります。また全摘すると、胃酸がアルカリ性になり逆流するので、その場合は個人的にはフォイパンや粘膜保護製剤を使用します。」

Q.「エレンタールを継続服用するにはどうすればよいですか」

A.「個人的には手術後の体重減少を予防するために、術中にチューブを設置して退院後も口から 1200kcal くらい好きなもの食べて、経腸から 600kcal くらい投与することを理想としています。１～３か月くらい様子を見て、食べられるようになればチューブを取ればよいと考えます。しかしながら患者さんによっては、すぐにチューブを取りたがり、結局口から食べられず、1 か月後入院する方もいます。」