

実践勉強会 実施レポート

大田区薬剤師会
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 共催

「非小細胞肺がんの治療」
～薬物治療・TKI 治療を中心に～
東邦大学医療センター大森病院 呼吸器センター内科 講師
磯部 和順 先生

参加 61 名

アサヒ調剤薬局	中畔、木島、桑原
アサヒ薬局	中畔、内田
アサヒ薬局医大前店	八巻、豊田
あおば薬局大森赤十字店	平良、小澤
秋島薬局	秋嶋、小寺
いけがみ薬局	佐野
エース薬局大森店	河本、森田
江島薬局	江島
大森会営薬局	田川、和田、石原
大森赤十字病院	平岩、大橋、市川、石久保、博田、 池末、飯行、遠藤
大森プライマリー薬局	清水、荒井
大森薬局	富岡
きぼう薬局	藤岡
げんき薬局	糸川
コーコク薬局	田辺、松原、五十嵐
サガワ薬局	小野木
山王薬局1丁目店	安藤
スマイル薬局池上店	及川
すみれ調剤薬局	平賀
ちどりフローラ薬局	亀井
長栄堂薬局	嶋田、森下、秋山、堀越
東京労災病院	岩永
東邦大学大森病院	竹内、青山、小川、西尾、椿原

ナガエ薬局	矢幅
ひまわり調剤薬局	曾我
平井薬局	藤巻、栗原
ひろみ薬局	井出
ひろみ薬局中央店	外山
フレンド薬局池上店	窪田
みつこし薬局	浜田
美原薬局梅田店	福崎
森ヶ崎薬局	木村

質疑応答

Q: TKI3 剤の使い分けについてはどう考えるか

A: ケースバイケースであるが、例えば Exon19 の欠失変異であればジ
オトリフ、脳転移があったり若年者ではタルセバ、高齢者ではイレ
ッサと使い分けたりしている。

Q: PPI と TKI の併用に関し、薬剤師が留意することは

A: PPI は使わずに、間質性肺疾患の抑制効果があるといわれているセル
ベックスを使用したり工夫している。

Q: 他の疾患で PPI を使用している患者へは。

A: 問題ない限り継続を考える。TKI の効果が落ちる印象はない。

Q: 理想的な抗癌剤はなぜできないか。ジオトリフは共有結合し、効
果が強そうに思えるが。すべての EGFR レセプターに結合しないから
か。キナーゼ阻害しても増殖は防げないからか。毒性で継続不可に
なるからか。

A: 現在多くの研究者が当該研究を行っており、決定的な回答はまだ
でていない。キナーゼ阻害を行っても、違うバイパス経路によるシ
グナル伝達も考えられる。また初期耐性（最初から効かない）人も
存在する。

Q: 小細胞癌ではなぜ、殺細胞性抗癌剤が奏功するのか。

A: 癌の性格もある。また小細胞癌は細胞分裂周期が早いため、殺細
胞性抗癌剤が奏功しやすい。

Q：皮疹を認める患者への薬剤師からの指導はどうすべきか。

A：皮疹があっても我慢してしまう患者が多いが、なるべく変化があれば来院を勧めて頂きたい。また清潔を保つように指導していただきたい。

Q：気管支鏡時の抗血栓薬の休薬対応はどうする。

A：東邦大大森病院では抗血栓薬を休薬するガイドラインを設け、それを使用している。ヘパリン化に関しては、循環器科へのコンサルを行う。全例ヘパリン化はしない。